

# РОВАТИНЕКС

**Уникальный препарат  
от мочекаменной болезни  
из ЕВРОПЫ!**

*РОВАТИНЕКС, зарекомендовавший себя во всем мире,  
теперь доступен и в России!*

- **РОВАТИНЕКС** способствует выведению почечных камней и камней мочевыводящего тракта
- **РОВАТИНЕКС** обладает спазмолитическим действием, способствует прохождению камней по мочевыводящим путям, уменьшает боли при почечных и мочеточниковых коликах
- **РОВАТИНЕКС** обладает противовоспалительным и противомикробным действием



# ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата РОВАТИНЕКС

**Лекарственная форма:** капсулы кишечнорастворимые

**Состав:**

1 капсула содержит:

**активные ингредиенты:** пинен [ $\alpha+\beta$ ] 31,0 мг; камфен 15,0 мг; cineol 3,0 мг; фенхон 4,0 мг; борнеол 10,0 мг; анетол 4,0 мг.

**неактивные ингредиенты:** масло оливковое; оболочка: желатин, глицерол 85%, натрия этилпарагидроксibenзоат, натрия пропилпарагидроксibenзоат, хинолин желтый WS 70%, E104, закатно-желтый FCF 85%, E110.

**Показания к применению:**

Камни в мочевыводящих путях, в почках, расстройства функции почек и симптоматика, связанная с этими заболеваниями. Роватинекс способствует уничтожению или выведению камней и есть данные о том, что он предотвращает образование камней.

**Противопоказания:**

Никаких известных противопоказаний для приема Роватинекса нет.

Беременность и кормление грудью:

Хотя не отмечалось никаких тератогенных воздействий данного препарата, беременным женщинам не рекомендуется принимать Роватинекс в первый триместр беременности.

**Способ применения и дозы:**

а) Способ применения:

Принимают внутрь до еды.

б) Дозировка:

Для взрослых: Если врачом не указано иное, обычная доза составляет 1-2 капсулы три раза в день до еды. В случае колик – 2-3 капсулы четыре-пять раз в день.

Для детей 6-14 лет: Обычная доза составляет 1 капсулу два раза в день до еды.

**Особые указания:**

Роватинекс не пригоден к применению больными с выраженными коликами, анурией или тяжелой инфекцией мочевыводящих путей.


Прием жидкости нужно в процессе лечения увеличивать. Препарат нужно принимать с осторожностью больным, проходящим лечение противосвертывающими препаратами или препаратами, нуждающимися в участии печени для их метаболизма и выведения из организма.

Несовместимость с другими веществами:

Никакие данные о несовместимости не известны.

Влияние препарата на способность управлять транспортным средством или работать на каких-либо машинах

Никакого влияния не оказывает.



**Форма выпуска:**

Капсулы кишечнорастворимые.

По 10 капсул в блистер из плотной полихлорвиниловой пленки и фольги.

По 5, 10 блистеров с инструкцией по применению в картонной пачке.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек:

Отпускается по рецепту врача.

**Производитель:**

Рова Фармасьютикалз Лтд, Ирландия

**Представительство в России:**

“ЗАО МЕДИНТОРГ”

123308, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 74/2.

Тел./факс: (495) 921-25-15

[www.medintorg.ru](http://www.medintorg.ru)